

## Squalo bruno

*Carcharhinus obscurus* (Lesueur, 1818)

### Classificazione:

Ordine *Carcharhiniformes*, Famiglia *Carcharhinidae*, Genere *Carcharhinus*, Specie: *obscurus*

### Nomi comuni in altre lingue:

- Inglese: bronze whaler, black whaler, dusky shark
- Francese: Requin de sable
- Spagnolo: tiburón arenero

**Morfologia:** squalo massiccio, muso mediamente lungo ed arrotondato, occhi grandi e tondi, prima pinna dorsale non molto sviluppata, seconda dorsale di dimensioni simili all'anale. Pinna caudale asimmetrica, lobo superiore più sviluppato. Pinne pettorali lunghe, falciformi.




Fig. 1: *Carcharhinus obscurus* (illustrazione I. K. Ferguson)

**Colorazione:** Dorso grigio tendente al blu, ventre bianco. Apici delle pinne scuri negli individui giovani.

**Forma dei denti:** triangolari, grandi con bordi seghettati nella mandibola superiore, più piccoli, dritti e a punta in quella inferiore.

**Tipo di sviluppo embrionale:** viviparo.

**Numero di piccoli per figliata:** Atlantico occidentale da 6 a 10 (in media 8), Atlantico sud orientale da 6 a 14 (media 10). Rapporto tra i sessi 1:1.

**Dimensioni alla nascita:** 70-100 cm.

**Dimensioni alla maturità sessuale:** maschi circa 280 cm, femmine circa 257 cm.

**Dimensioni:** dimensioni medie 200-250 cm, fino a 420 cm

**Dieta:** Pesci ossei, squali, razze, cefalopodi, crostacei, serpenti marini.

---

---

**Habitat:** Specie essenzialmente costiera, essenzialmente bentonica, frequentemente in acque superficiali raggiunge profondità fino a 400m. Predilige acque saline, non entra in corsi d'acqua dolce. Nurseries in estuari e baie in acque poco profonde.

**Distribuzione geografica:** specie cosmopolita, lungo le coste continentali. Atlantico: dalla Nuova Scozia a Cuba, Golfo del Messico compreso, dalle coste del Nicaragua a quelle meridionali del Brasile. Indopacifico: Sudafrica, Golfo della California, Australia e Coste del Madagascar. Presente in Mediterraneo.

Specie migratoria, si sposta verso nord in estate, verso sud in inverno. Segregazione sessuale degli individui non maturi lungo le coste del Sudafrica: maschi si muovono verso sud, le femmine verso nord.




Fig. 2: Aree di diffusione dello squalo bruno

**Pericolosità:** Pochissimi attacchi segnalati, ma potenzialmente pericoloso per via delle dimensioni e della presenza in acque poco profonde.

**Curiosità:** Spesso confuso con il *C. plumbeus*, ma può essere da esso distinto grazie alla prima pinna dorsale, più piccola e più arretrata.

---